



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

1. Больной 55 лет, страдает гипертонической болезнью. Получил телеграмму о смерти близкого родственника, и почувствовал себя плохо: появилось головокружение, головная боль, повторная рвота. При осмотре: сознание сохранено, очаговых симптомов поражения нервной системы нет. Артериальное давление 210/130 мм рт. ст., пульс 60 ударов в 1 минуту.

Подберите наиболее вероятный диагноз:

2. Больная Т. 34 года, инвалид II группы. В отделении большую часть времени лежит, закрывшись с головой одеялом, что-то шепчет, улыбается. В разговор вступает неохотно. Удастся выяснить, что больная непрерывно слышит «голоса» большой группы людей, которые «прикрепляются» к ее голове с помощью каких-то аппаратов. Людей этих больная никогда не видела, но по их разговорам поняла, что они только и делают, что «занимаются половой жизнью». Головы этих людей связаны с ее головой, и потому она может обмениваться с ними мыслями. Такое состояние больная называет «гипнозом». Чувствует, как эти люди действуют на ее половые органы, «используют, как женщину», превращают в гермафродита, изменяют ее настроение, извращают вкус и запах пищи, превращают его в запах грязного человеческого тела, могут отнять у больной все мысли — «пустая голова и все». Уверена, что обладатели «голосов» превратили ее и всех других людей в роботов.

Выделите основной клинический синдром:

3. У больного грипп, высокая температура. При осмотре беспокоен, суетлив, в беседе часто отвлекается, в окружающей обстановке ориентировка нарушена, часто вскакивает с постели, что-то ищет под подушкой, заглядывает под кровать, копается в постельном белье, шарит рукой по стене, пытался поймать воображаемых насекомых, порой испуганно озирается, разговаривает сам с собой. Наиболее вероятно, что у больного:

4. Больной в прошлом перенес тяжелую черепно-мозговую травму. В текущем году у него неожиданно, независимо от времени суток, на фоне сохраненного сознания появляются судорожные подергивания мимической мускулатуры, далее начинают подергиваться пальцы рук, затем мышцы ноги, такие состояния длятся 2-3 минуты, заканчиваются самостоятельно. Больного беспокоит, что эти нарушения возникают до 5-6 раз в день. Наиболее вероятно, что у больного:

5. Восстановите правильную последовательность расположения препаратов группы транквилизаторы-седатики в зависимости от силы воздействующего эффекта (от самого сильного препарата к самому слабому):

6. Расположите в правильной последовательности, в зависимости от частоты встречаемости (начиная с наименьшей), факторы, связанные с риском возникновения шизофрении у детей и болезнью родителей:

7. Расположите в порядке возникновения возрастные уровни нервно-психического реагирования при пограничных психических расстройках:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com



ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на нас в Телеграм



Подписчикам СКИДКИ! Телеграмм канал — t.me/sinerqy
Магазин готовых ответов на тесты купить в магазине по ссылке: sinerqy.com/list/
Нужна помощь с тестами, практикой? Пиши: sinerqy@yandex.ru, WhatsApp, Telegram

8. Расположите в правильной последовательности фазы развития типичного мигренозного пароксизма:
9. Установите соответствие между названиями видов боли и их особенностями:
10. Установите соответствие между названием расстройств мышления и их описанием:
11. Установите соответствия между названиями категорий психотропных препаратов и специфическими особенностями их воздействия:
12. Установите соответствие между названиями видов затяжного течения психических расстройств и их особенностями:
13. ... заболевание, характеризующееся избыточным скоплением цереброспинальной жидкости в желудочковой системе головного мозга либо в результате затруднения ее перемещения от места секреции (желудочки головного мозга) к месту абсорбции в кровеносную систему (субарахноидальное пространство), либо в результате нарушения абсорбции.
14. Один из ведущих синдромов невротических расстройств, характеризующийся навязчивым переживанием страха с четкой фабулой, обостряется в определенных ситуациях при наличии достаточной критики — это ...
15. ... связана с невротическим конфликтом по типу «хочу, но не могу» — завышенными претензиями личности, сочетающимися с недооценкой или полным игнорированием своих умственных или физических возможностей.
16. Приобретенное психическое расстройство, проявляющееся снижением интеллекта и нарушающее социальную адаптацию больного и не сопровождающееся нарушением сознания, — это ...
17. Какие из перечисленных симптомов относятся к гипертонически-гипокинетическому синдрому:
18. Из приведенных симптомов исключите три, не относящихся к менингеальным:
19. Главное расстройство при корсаковском синдроме:
20. Расстройство речи, вызванное поражением коркового центра:

Самый быстрый способ связи - мессенджер (кликни по иконке, и диалог откроется)



WhatsApp



Telegram



Max



sinerqy@yandex.ru



sinerqy.com

<https://sinerqy.com/list/>
готовые ответы магазин

<https://sinerqy.com/konsultaciya/>
готовые ответы магазин